

Neporex® 50 SP



Uso Veterinário

Larvicida para o controle de moscas em avicultura e suinocultura.

Fórmula:

Cada 100 g contém:	
Ciromazina técnica (100%)	50,0 g
Inertes q.s.p.	100,0 g

Indicações:

NEPOREX 50 SP é indicado para o controle de moscas em geral no esterco de aves e suínos, através da pulverização direta sobre estes materiais.

Modo de usar:

1. Aves criadas em gaiolas

Recomenda-se pulverizar o esterco acumulado sob as gaiolas, na dosagem de 1 g de **NEPOREX 50 SP** para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida diluindo-se 100 g de **NEPOREX 50 SP** em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para cada 5 m² de esterco.

Os pulverizadores costais são os mais práticos para este tratamento. Antes do tratamento com **NEPOREX 50 SP**, aconselhasse a retirada de 90% do esterco velho e infestado com pupas. A pequena parte restante visa propiciar um meio de preservação dos “predadores” naturais presentes no esterco. A fim de evitar-se a formação de pupas, formas estas não atingidas pelo **NEPOREX 50 SP**, a aplicação deve ser feita no máximo até 5 dias após a retirada do esterco ou quando o mesmo atingir 5 cm de altura. A aplicação de 1 g de **NEPOREX 50 SP** por metro quadrado de esterco com altura de 5 cm, confere uma concentração de aproximadamente 10 ppm do princípio ativo no esterco.

Para se obter a diminuição rápida da população de moscas no ambiente, sugere-se que no dia da aplicação do **NEPOREX 50 SP**, seja feito um tratamento ambiental na forma de aplicação de mosquicidas.

O esterco tratado com **NEPOREX 50 SP** fica protegido contra infestação de larvas de moscas por um período de até 4 semanas. A população de moscas no ambiente, contudo, é mantida sob controle por até 6 semanas, período este que pode ser aumentado com a aplicação de inseticidas entre a 6^a e a 7^a semana. Após este período recomenda-se tratar novamente com **NEPOREX 50 SP**.

Não havendo possibilidade de retirada do esterco, recomenda-se a reaplicação do produto em todos os principais focos de larvas, até que se possa remover todo o esterco e repetir-se o tratamento completo.

2. Suínos

Recomenda-se a aplicação semanal de **NEPOREX 50 SP** nas esterqueiras ou montes de esterco, na proporção de 1 g do produto para cada metro quadrado de superfície.

Caso a esterqueira seja do tipo que armazena esterco líquido, a aplicação pode ser feita a cada 4 semanas.

Dosagem:

Aves criadas em gaiolas e suínos:

1 grama de **NEPOREX 50 SP** para cada metro quadrado. Esta concentração é obtida diluindo-se 100 g do produto em 20 litros de água e aplicando-se 1 litro da solução para cada 5 m² de esterco.

Forma de aplicação

Aplicar com regador ou pulverizador costal.

Precauções:

- Manter as embalagens em local fresco e seco.
- Recomenda-se o uso de luvas de borracha quando da aplicação do produto.
- Evitar o contato do produto com os olhos, pele e roupas.
- Em caso de acidente, lavar as partes atingidas com água em abundância.
- Conservar longe do alcance de crianças e animais domésticos.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.
- Manipular o produto somente em áreas arejadas.
- Não fumar ou beber durante a aplicação do produto.
- Após a manipulação do produto, lavar bem as mãos.

Antídoto:

Não específico, tratamento sintomático.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 2250 em 25/06/85
Responsável técnico: Denis Frota Daflon CRMV-SP 23.802

Proprietário: NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA.

Av. Prof. João Vilalobo Quero, 2.253 - CEP 06421-300 - Barueri - SP
CNPJ: 00.820.120/0005-69

Fabricante: Ipanema Ind. de Produtos Veterinários Ltda.

Rod. Raposo Tavares Km 113 - CEP 18190-000 Araçoiaba da Serra - SP
CNPJ: 64.687.015/0001-52

INFORMAÇÕES AO CLIENTE:

0800 - 888 - 8280
São Paulo - segunda à sexta
das 8:00 às 17:00 horas.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

© Marca Registrada da Novartis AG, Basileia, Suíça.



**CUIDADO
VENENO**