



Ficha Técnica

POLYSECT[®] ULTRA PRONTO

LINHA JARDINS E HORTAS FAMILIARES.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO NÃO PROFISSIONAL.
PARA EVITAR RISCOS PARA OS SERES HUMANOS E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Insecticida sistémico pronto a utilizar, que actua por contacto e ingestão, contra ácaros, afídeos, cochonilhas, moscas brancas e tripes em plantas de interior, roseiras, culturas florais diversas, árvores e arbustos ornamentais em jardins familiares.

Líquido pronto a usar com 0,05 g/l ou 0,005% (p/p) de acetamiprida
Autorização de Venda n.º 0193 concedida pela DGADR.

PROTECÇÃO

Sem preparação nem dosagem, o produto pronto a utilizar POLYSECT ULTRA AL elimina rapidamente os piolhos, lagartas, moscas brancas, ácaros e outras pragas das roseiras, flores e plantas de interior, árvores e arbustos ornamentais.
Não mancha nem as flores nem as folhas das plantas a proteger.

MODO DE ACÇÃO

A acetamiprida pertence ao grupo químico dos neonicotinóides e actua no sistema nervoso dos insectos, sendo antagonista do receptor nicotínico da acetilcolina.

Acção sistémica: POLYSECT ULTRA AL circula através da seiva das plantas tratadas e permanece activo durante 3 a 4 semanas, prevenindo, assim, as reinfestações.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tratar com o tempo ameno e calmo, em dias sem chuva.
Tratar ao aparecimento das pragas ou dos primeiros estragos.

DOSE DE APLICAÇÃO

Dose de aplicação recomendada: 1 litro por 10 m².

Cultura	Inimigo	Dose de aplicação
Plantas de interior Rosas (<i>Rosa</i> spp.), Cravos (<i>Tagetes</i> spp.) Fúcsias (<i>Fuchsia</i> spp.), Pelargónios (<i>Pelargonium</i> spp.), Árvore-da-borracha (<i>Ficus benjamina</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp.) Afídeos (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus persicae</i>) Cochonilhas (<i>Coccus</i> sp., <i>Pseudococcus</i> sp.) Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Tripes (<i>Thrips</i> sp.)	1litro / 10 m ²
Roseiras (<i>Rosa</i> spp.)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp.) Afídeos (<i>Macrosiphum rosae</i>) Cochonilhas (<i>Coccus</i> sp., <i>Pseudococcus</i> sp.) Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Tripes (<i>Thrips</i> sp.)	1litro / 10 m ²
Culturas florais diversas Begónias (<i>Begonia</i> sp.), Crisântemos (<i>Chrysanthemum</i> spp.), Dálías (<i>Dhalia</i> sp.) Petúnias (<i>Petunia</i> spp.), Sálvias (<i>Salvia</i> sp.), Cravos (<i>Tagetes</i> spp.).	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp.) Afídeos (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus persicae</i>) Cochonilhas (<i>Coccus</i> sp., <i>Pseudococcus</i> sp.) Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Tripes (<i>Thrips</i> sp.)	1litro / 10 m ²
Árvores e arbustos ornamentais Bétulas (<i>Betula</i> sp.), Faias (<i>Fagus</i> sp.), Choupos (<i>Populus</i> sp.), Azáleas (<i>Azalea</i> sp.), Urzes (<i>Erica</i> spp.), Hibiscos (<i>Hibiscus</i> sp.), Loendros (<i>Nerium oleander</i>)	Ácaros (<i>Tetranychus</i> sp.) Afídeos (<i>Aphis</i> sp., <i>Myzus persicae</i>) Cochonilhas (<i>Coccus</i> sp., <i>Pseudococcus</i> sp.) Moscas brancas (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Tripes (<i>Thrips</i> sp.)	1litro / L

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não tratar poinsétias e filipêndulas.

Não tocar nas plantas tratadas antes de secagem completa.

Efectuar um ensaio preliminar numa parte da planta a tratar antes de generalizar a aplicação, para avaliar possíveis efeitos fitotóxicos.

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha neonicotinóides mais de duas vezes por cultura e por ano.

MODO DE APLICAÇÃO

Agitar a embalagem antes da utilização.

Para desbloquear o sistema de segurança, carregar na parte superior da cabeça do pulverizador e rodar o bico de pulverização até obter a largura de jacto desejada.

Pulverizar a planta a tratar a uma distância de 30 a 40 centímetros.

Após utilização, rodar o bico de pulverização para a posição de segurança inicial.

Em caso de forte infestação, realizar novo tratamento após 10 a 14 dias.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Não armazenar o produto a temperaturas negativas.

Guardar fechado à chave.

Antes da aplicação do produto em plantas de interior, tapar alimentos e utensílios de cozinha, retirar do compartimento ou tapar aquários e gaiolas e manter afastados os animais domésticos.

Não respirar a nuvem de pulverização.

Evitar o contacto com a pele.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Tratamento de Emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em locais adequados à sua recolha.

Telefone do CIAV (Centro de Informação Antivenenos) : 808 250 143

SCOTTS FRANCE SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92 – 69136 Ecully Cedex

FRANÇA

Tel.: 04.72.86.67.00

Distribuído por:

Liscampo, SA

Travessa do Carvalho, 31-35

1200-097 LISBOA

Tel.: 213 471 271