

GENERATION PAT'



PARA GRANDES INFESTAÇÕES

INGESTÃO ÚNICA

EXTREMAMENTE PALATÁVEL

RATOS E RATOS DOMÉSTICOS

Contém: 0.0025% DIFETIALONA

USO PROFISSIONAL

O GENERATION PAT' baseia-se numa fórmula altamente palatável, graças aos seus ingredientes de alta qualidade e à textura do isco.

O GENERATION PAT' é um engodo baseado em Difetialona : um Anticoagulante de última geração que actua reduzindo a actividade de coagulação causando hemorragias internas. O período de tempo entre a ingestão e a morte depende da dose ingerida do produto evitando as suspeitas de outros roedores que possam existir na área. Os efeitos poderão ser observados 3 a 5 dias após a ingestão dos primeiros engodos.

Uma única toma é suficiente para atingir a dose letal.

DETECÇÃO

O comportamento alimentar dos ratos domésticos e dos ratos é diferente.

O rato doméstico tem um comportamento eclético e consome pequenas quantidades em vários locais de alimentação.

O rato consome tudo o que necessita no mesmo local de alimentação.

Identifique o tipo de roedor com que vai lidar (rato castanho, rato preto ou rato doméstico) e as quantidades de vestígios ou danos (ninho, tocas, fezes, etc.). O tratamento é feito de acordo com o nível de infestação, estimado ou pelos vestígios dos roedores ou pelos danos visíveis.

Elimine todas as fontes de alimentação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

| Organismo alvo | Nível de Infestação | Dose de Aplicação Recomendada | Frequência do controlo | Verificação / Reposição | Duração e Local |
|----------------|---------------------|--|--|---|--|
| Rato Doméstico | Alto | Até 50grs por ponto de isco, a cada 1 a 1.5 metros | 3 dias após a 1ª aplicação e depois 1 vez por semana | Voltar a colocar o isco (caso esteja parcial ou totalmente consumido) | Todo o ano No interior de edifícios |
| | Baixo | Até 50grs por ponto de isco, a cada 2 a 3 metros | 1 semana após a 1ª aplicação e depois quinzenalmente | Voltar a colocar o isco (caso esteja parcial ou totalmente consumido) | |
| Ratos | Alto | Até 200grs por ponto de isco, a cada 4 a 5 metros | 3 dias após a 1ª aplicação e depois 1 vez por semana | Voltar a colocar o isco (caso esteja parcial ou totalmente consumido) | |
| | Baixo | Até 200grs por ponto de isco, a cada 8 a 10 metros | 1 semana após a 1ª aplicação e depois regularmente enquanto persiste o consumo | | |

GENERATION PAT' está pronto a usar. Não tente abrir a saqueta da pasta. Coloque o produto o mais perto possível dos vestígios do roedor. Coloque o isco num local inacessível a crianças, animais e pássaros. Os iscos devem ficar seguros: em tabuleiros adequados, sob armários, atrás de móveis, escondidos ou numa armadilha resistente, como as armadilhas para prevenir o acesso de animais não visados ou de crianças. Quando possível, prenda os iscos para que não possam ser arrastados. Quando as estações com fecho de segurança são usadas, devem ser marcadas claramente para mostrar que contém raticidas e que não se deve mexer elas. Coloque o engodo junto às paredes e em lugares onde haja sinais de actividade. O corante azul da pasta ajuda a detectar o consumo do isco nos excrementos dos roedores.

Os animais alvo podem consumir a dose letal numa única toma, aparecendo os primeiros roedores mortos entre 3 a 5 dias após o primeiro consumo. O tratamento pode durar de 2 a 4 semanas, dependendo do nível de infestação.

CUIDADOS A SEGUIR

Procure e remova os roedores mortos, a intervalos frequentes, durante o tratamento, pelo menos com a mesma frequência que verifica os engodos e/ou os torna a colocar. Recolha os cadáveres para prevenir problemas de saúde pública e intoxicações secundárias, e elimine os cadáveres de acordo com o estabelecido para a sua zona de residência.

Limpeza: não use raticidas anticoagulantes como engodos permanentes. Remova todos os iscos e tabuleiros com isco após o tratamento e deite-os fora conforme o estabelecido no seu local de residência

ARMAZENAMENTO E ELIMINAÇÃO

Não contamine água, comida ou rações por armazenamento ou eliminação dos resíduos.

Esta embalagem não é reutilizável.

Guarde na embalagem original num local fresco e seco inacessível a crianças e animais.

Eliminação da embalagem: Não reutilize ou torne a encher esta embalagem.

Use produtos biocidas com precaução. Antes de qualquer utilização, leia atentamente o folheto de instruções e as informações do produto. Respeite as instruções de utilização para evitar riscos humanos e ambientais.

RESTRICÇÕES DE USO

Recomenda-se a utilização de luvas.

Lave as mãos antes e depois de usar.

Guarde o produto num local fora do alcance de crianças e animais.

Mantenha longe de comida, bebidas e rações para animais.

Enquanto utiliza o produto, não coma, beba ou fume.

Se ingerido, procure imediatamente auxílio médico e mostre a embalagem ou este folheto de instruções.

Guarde sempre na embalagem original. Este material e a sua embalagem devem ser deitados fora de forma segura.

PRIMEIROS SOCORROS

Tenha consigo este folheto quando obtiver recomendações para tratamento. Em caso de emergência, telefone de imediato para o centro de informação anti-venenos (telefone: 808 250 143) ou para o médico para recomendações de tratamento. Antídoto: Vitamina K1 (sob vigilância médica)

REGULAMENTAÇÃO

R52/53 Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

S 2 Manter fora do alcance das crianças.

S 13 Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

S 20/21 Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

S 37 Use luvas adequadas.

S 46 Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico (mostrar o rótulo, se possível).

S 61 Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções / fichas de segurança.

Quando o produto for usado em áreas públicas interiores, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e um aviso deve ser disponibilizado junto aos iscos explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como a indicação das primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento.

O produto não deverá ser reutilizado ou reciclado.

Autorização de colocação no mercado: N° PT/DGS ARMPB-004/2012 concedida pela DGS

Detentor de autorização: LIPHATECH S.A.S, BONNEL BP3

47480 PONT DU CASSE, FRANÇA

Fabricado por: LIPHATECH S.A.S, ZA MALERE,

47480 PONT DU CASSE, FRANÇA